

**Енроксил® (Enroxil®) 50 мг (mg) таблетки зі смаком м'яса
(таблетки)
листівочка-вкладка**

Опис

Круглі, злегка двоопуклі таблетки з рисою на одному боці, від кремового до блідо-коричнюватого кольору з можливими білими та темними плямами.

Склад

1 таблетка (183 мг) препарату містить діючу речовину:
енрофлоксацин – 50 мг.

Допоміжні речовини: маніт, крохмаль кукурудзяний, натрію крохмальгліколят, ароматизатор м'ясний 10022, акрилатний сополімер, натріюлаурилсульфат, дибутилсебацінат, натрію кроскармелоза, кремнію діоксид колоїдний безводний, тальк, магнію стеарат.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01MA90 - Енрофлоксацин.

Енрофлоксацин належить до антибіотиків групи фторхінолонів. Він ефективно діє проти більшості патогенних грампозитивних (*Actinobacillus spp.*, *Enterococcus spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Staphylococcus aureus*, *Clostridium perfringens* і *Streptococcus spp.*), грамнегативних (*Bordetella spp.*, *Campylobacter spp.*, *E. coli*, *Haemophilus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Vibrio parahaemolyticus*) мікроорганізмів, а також мікоплазм (*Mycoplasma spp.*). Енрофлоксацин проявляє протимікробну дію шляхом гальмування активності ферменту ДНК-гірази, який є каталізатором реплікації ДНК у бактеріальній клітині. Гальмування активності ДНК-гірази призводить до функціональних розладів, блокування біосинтезу у клітині та загибелі патогенного мікроорганізму. Чинить бактерицидну дію, особливо по відношенню до мікроорганізмів, резистентних до бета-лактамних антибіотиків, тетрациклінів, аміноглікозидів і макролідів.

У дослідженнях на собаках за застосування енрофлоксацину в дозі 4,91 мг/кг маси тіла максимальна його концентрація в плазмі крові становить $1179,94 \pm 260,83$ нг/мл і досягалася через $1,57 \pm 0,62$ год. Період напіввиведення становить 3,78 год.

Майже 40% енрофлоксацину, введеного собакам перорально, перетворюється в ципрофлоксацин. Максимальна концентрація ципрофлоксацину у плазмі крові сягає $491,99 \pm 57,95$ нг/мл. T_{max} становить $1,79 \pm 2,6$ год. Період напіввиведення становить 5,10 год.

Енрофлоксацин швидко надходить у тканини. Концентрація у тканинах і рідинах тканин у 2-3 рази перевищує концентрацію у сироватці крові. Високі рівні енрофлоксацину відмічаються в легенях, печінці, нирках, шкірі, кістках та лімфатичній системі. Енрофлоксацин також надходить у цереброспінальну рідину, внутрішньоочну рідину та у плід вагітних тварин.

Енрофлоксацин виводиться з організму, головним чином, разом із сечею.

Застосування

Лікування собак за захворювань травного каналу, органів дихання і сечостатевої системи, шкіри та вух (зовнішній отит), вторинних інфекцій ран, що спричинені чутливими до енрофлоксацину мікроорганізмами.

Дозування

Перорально у дозі 5 мг енрофлоксацину на 1 кг маси тіла (1 таблетка на 10 кг маси тіла) на добу одноразово або по 2,5 мг енрофлоксацину на 1 кг маси тіла (1/2 таблетки на 10 кг маси тіла) двічі на добу, незалежно від годівлі.

Тривалість лікування становить 5 – 10 діб.

Протипоказання

Підвищена чутливість до енрофлоксацину.

Не застосовувати при виявленні резистентних до хінолонів штамів патогенних бактерій.

Не застосовувати собакам малих порід у перші 12 місяців життя і собакам великих порід - у перші 18 місяців життя.

04.03.2026

Не застосовувати тваринам з ознаками захворювань центральної нервової системи.

Не застосовувати одночасно з препаратами тетрациклінового ряду, макролідами, хлорамфеніколом, теофіліном.

Не застосовувати з профілактичною метою.

Не застосовувати одночасно з антацидами, оскільки вони можуть уповільнювати всмоктування енрофлораксацину.

Не застосовувати тваринам під час вагітності та лактації.

Застереження

Побічна дія

Собаки:

Дуже рідко (<1 тварина / 10 000 тварин, що пройшли лікування, включаючи окремі випадки):	Анорексія Блювання
Невизначена частота виникнення (не може бути оцінена на основі наявних даних):	Захворювання суглобового хряща ¹

¹У період швидкого росту може бути порушений розвиток суглобового хряща.

Особливі застереження при використанні

Фторхінолони слід використовувати лише для лікування клінічних станів, які погано реагують або очікується, що будуть реагувати на інші класи протимікробних препаратів.

Перед застосуванням препарату рекомендовано зробити тест на чутливість мікроорганізму-збудника захворювання до енрофлораксацину. Використання ветеринарного лікарського засобу, що відхиляється від інструкцій, наведених у КХП, може збільшити поширеність бактерій, стійких до фторхінолонів, та знизити ефективність лікування іншими хінолонами через потенційну перехресну резистентність.

Під час використання ветеринарного лікарського засобу слід враховувати офіційну та місцеву політику щодо протимікробних препаратів.

Не застосовувати у випадку виявлення мікроорганізмів резистентних до хінолонів, оскільки існує майже повна перехресна резистентність до інших хінолонів та повна перехресна резистентність до інших фторхінолонів.

Не перевищуйте рекомендовану дозу.

Застосовувати з обережністю ветеринарний лікарський засіб собакам з тяжкою нирковою або печінковою недостатністю.

Застосування під час вагітності, лактації, несучості

Не застосовувати тваринам під час вагітності та лактації.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовувати одночасно з препаратами тетрациклінового ряду, макролідами, хлорамфеніколом, теофіліном.

За одночасного застосування з антацидами та препаратами, що містять у своєму складі катіони Mg^{2+} та Al^{3+} порушується абсорбція енрофлораксацину.

Супутнє застосування фторхінолонів може посилити дію пероральних антикоагулянтів.

Форма випуску

10 таблеток в блістері, 1 або 10 блістерів у картонній упаковці.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.

Термін придатності – 3 роки. Половину таблетки можна повернути до блістера та використати протягом 24 годин.

Для застосування у ветеринарній медицині!

04.03.2026

Власник реєстраційного посвідчення:

КРКА, д.д., Ново место
Шмар'єшка цеста 6,
8501 Ново место,
Словенія.

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Slovenia

Виробник готового продукту

КРКА, д.д., Ново место
Шмар'єшка цеста 6,
8501 Ново место,
Словенія;
КРКА-ФАРМА д.о.о.,
В. Холєвца 20/Е,
10450 Ястребарско,
Хорватія.

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Slovenia;
KRKA-FARMA d.o.o.,
V. Holjevca 20/E,
10450 Jastrebarsko,
Croatia.