

1 0 9. 2021

Коротка характеристика препарату

1. Назва

ФІПРИСТ® Спот-он для собак

2. Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

фіпроніл – 100 мг.

Допоміжні речовини: повідон К25, полісорбат 80, бутилгідрокситолуол, бутилгідроксіанізол, етанол 96%, діетиленгліколю моноетиловий ефір.

3. Фармацевтична форма

Розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення.

4. Фармакологічні властивості

АТСvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX15, фіпроніл)

Фіпроніл – похідний піразолу з інсектицидною і акарицидною дією. Він блокує ГАМК-залежні рецептори паразитів, порушує процес передачі нервових імпульсів у комах, але не має такої дії на ГАМК-рецептори ссавців.

Після нанесення на шкіру препарат кумулюється в епідермісі, волосяних цибулинах та сальних залозах тварини і має тривалу контактну інсектоакарицидну дію. Фіпроніл поширюється по шкірі й шерсті тварин від ділянки застосування до периферійних зон (поперекова зона, пахова зона). Концентрація фіпронілу у шерсті собак знижується до 3-4 мкг/г через 56 діб після застосування препарату.

За ступенем дії на організм ФІПРИСТ® Спот-он для собак належить до помірно небезпечних речовин (3 клас безпечності), при нанесенні на шкіру в рекомендованих дозах не має місцево-подразнюючої та резорбтивно-токсичної дії, при попаданні в очі викликає подразнення. Препарат є токсичним для риб і бджіл.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Собаки.

5.2 Показання до застосування

Профілактика та лікування собак при ураженнях ектопаразитами:

- блохами (*Ctenocephalides spp.*);
- іксодовими кліщами (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*);
- вошами (*Linognathus setosus*);
- волосоїдами (*Trichodectes canis*).

Профілактика та лікування блошиного алергічного дерматиту собак (FAD).

5.3 Протипоказання

Не застосовувати препарат тваринам віком до 8 тижнів та масою тіла менше 2 кг !

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам !

Не застосовувати препарат для лікування інших видів тварин, особливо кролів, через ризик виникнення небажаних реакцій, які можуть призвести до загибелі тварин !

5.4 Побічна дія

При підвищеній індивідуальній чутливості тварини до фіпронілу та у випадках злизування твариною препарату з оброблених ділянок можливі ускладнення: надмірне сльозовиділення, слинотеча, тремор м'язів, блювота, ознаки подразнення шкіри. При виникненні таких ускладнень препарат необхідно змити водою з милом.

5.5 Особливі застереження при використанні

Лікування рекомендується проводити комплексно із застосуванням етіотропних, патогенетичних і симптоматичних лікарських засобів.

При виявленні іксодових кліщів на тілі тварин їх видаляють механічно (пінцетом) і лише після цього обробляють препаратом.

1 0 9 2021

Препарат наноситься на місця, недоступні для злизування твариною. Після обробки препаратом декількох тварин, не допускати, щоб тварини облизували одне одного.

Після обробки не рекомендується купати тварин упродовж 2-х діб і не дозволяти їм плавати у водоймах.

Тварин рекомендується купати не частіше одного разу на тиждень. При використанні пом'якшувального шампуню і щотижневому купанні можливе скорочення періоду захисту тварин від бліх до 5-ти тижнів після обробки препаратом ФПРИСТ® Спот-он для собак. Щотижнєве купання тварин із використанням лікувального шампуню з 2% хлоргексидином не знижує ефективності препарату після обробки проти бліх (6 тижнів захисту).

За умови, що перед обробкою препаратом тварина була уражена іксодовими кліщами, зараження трансмісивними захворюваннями не виключається. Після обробки препаратом упродовж 24-48 год. Іксодові кліщі на тілі тварин гинуть і відпадають.

Після обробки препаратом не виключається ураження тварин поодинокими іксодовими кліщами у період захисної дії препарату.

Предмети догляду та місця перебування тварин (підстилки, килимки, кошики, м'які меблі) необхідно періодично чистити та обробляти відповідними інсекто-акарицидними засобами.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Препарат можна застосовувати самкам під час вагітності та лактації.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Невідома.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Препарат призначають дорослим собакам та цуценятam старшим 8-ми тижневого віку. Препарат можна застосовувати самкам під час вагітності та лактації.

Мінімальний інтервал між застосуванням препарату становить 4 тижні. Препарат наносять на суху, неушкоджену шкіру тварин між лопатками у дозі – одна піпетка відповідного розміру на одну тварину:

для собак масою тіла 2-10 кг – піпетка 0,67 мл;

для собак масою тіла 10-20 кг – піпетка 1,34 мл;

для собак масою тіла 20-40 кг – піпетка 2,68 мл;


для собак масою тіла 40-60 кг – піпетка 4,02 мл;

для собак масою тіла понад 60 кг – піпетка 4,02 мл і відповідна піпетка з меншою дозою.

Мінімальна рекомендована доза фіпронілу становить 6,7 мг/кг маси тіла тварини.

При підвищеному ризику повторного ураження блохами, при алергії тварин на ураження блохами та іксодовими кліщами, при частому купанні тварин із використанням гіпоалергічного та пом'якшувального шампуню тварин рекомендують обробляти препаратом щомісяця. У регіонах, де спостерігаються незначні умови ураження блохами та кліщами, тварин можна обробляти препаратом ФПРИСТ® Спот-он для собак через кожні два чи три місяці.

Для нанесення препарату необхідно взяти відповідну піпетку з однократною дозою вертикально, відкрутити і зняти ковпачок. Перевернути ковпачок, вставити його зворотну сторону у піпетку, натиснути і повернути ковпачок так, щоб проколоти захисну мембрану. Зняти ковпачок з піпетки, розділити шерсть тварини в ділянці основи шиї або в передній частині лопаток, або між лопатками, щоб було видно шкіру. Притиснути кінчик піпетки до шкіри й натиснути на піпетку кілька разів, щоб витиснути вміст піпетки.



1 0 9 2021

Препарат володіє захисним ефектом проти бліх впродовж 2-х місяців та проти іксодових кліщів впродовж 4 тижнів, залежно від епізоотичної ситуації. Після обробки препаратом блохи на шкірі тварини знищуються через 24 годин.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

При перевищенні рекомендованих доз у п'ять разів симптомів передозування не спостерігається.

Для обробки тварин необхідно використовувати піпетки з однократною дозою відповідно до маси тіла тварини.

5.10 Спеціальні застереження

Немає.

5.11 Період виведення (каренція)

Не регламентується.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Обробку тварин препаратом ФПРИСТ® Спот-он для собак слід проводити, користуючись гумовими рукавичками.

Під час роботи з препаратом не дозволяється курити, пити та приймати їжу.

Після закінчення роботи слід вимити руки теплою водою з милом.

При випадковому попаданні препарату на шкіру або слизові оболонки, його слід негайно змити проточною водою.

Після обробки тварин препаратом їх не можна гладити та допускати до дітей до повного висихання препарату на шкірі. Також після обробки тварин вони не повинні спати разом з господарями, особливо з дітьми.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Не встановлені.

6.2 Термін придатності

3 роки.

6.3 Особливі заходи зберігання

Препарат зберігають в упакованні виробника в сухому, захищеному від прямих сонячних променів, місці окремо від продуктів харчування та кормів за температури від 0 до 30 °С.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Поліпропіленові піпетки по 0,67; 1,34; 2,68; 4,02 мл з поліетиленовими або поліоксиметиленовими ковпачками з гострим кінцем. Піпетки запаковані у картонні упаковки по 1, по 3 або 10 штук, кожна піпетка у ламінованому пакеті.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний препарат та його залишки знешкоджуються у відповідності з національними вимогами.

Фіпроніл токсичний для риб та інших водних організмів. Не допускати попадання залишків препарату та тари з під препарату у водойми і навколишнє середовище.

7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

КРКА, д.д. Ново место

KRKA, d.d., Novo mesto (Slovenia)

Шмар'єшка цеста 6, 8501 Ново место,

Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto

Республіка Словенія

8. Назва і місце знаходження виробника

КРКА, д.д. Ново место

KRKA, d.d., Novo mesto (Slovenia)

Шмар'єшка цеста 6, 8501 Ново место,

Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto

Республіка Словенія

9. Додаткова інформація

ФШРИСТ® Спот-он для собак
(розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення)
листівка-вкладка

Опис

Розчин для зовнішнього застосування слабо жовтого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

фіпроніл – 100 мг.

Допоміжні речовини: повідон К25, полісорбат 80, бутилгідрокситолуол, бутилгідроксіанізол, етанол 96%, діетиленгліколю моноетиловий ефір.

Фармакологічні властивості

АТСvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX15, фіпроніл)

Фіпроніл – похідний піразолу з інсектицидною і акарицидною дією. Він блокує ГАМК-залежні рецептори паразитів, порушує процес передачі нервових імпульсів у комах, але не має такої дії на ГАМК-рецептори ссавців.

Після нанесення на шкіру препарат кумулюється в епідермісі, волосяних цибулинах та жирових залозах тварини і має тривалу контактну інсектоакарицидну дію. Фіпроніл поширюється по шкірі й шерсті тварин від ділянки застосування до периферійних зон (поперекова зона, пахова зона). Концентрація фіпронілу у шерсті собак знижується до 3-4 мкг/г через 56 діб після застосування препарату.

За ступенем дії на організм ФШРИСТ® Спот-он для собак належить до помірно небезпечних речовин (3 клас безпечності), при нанесенні на шкіру в рекомендованих дозах не має місцево-подразнюючої та резорбтивно-токсичної дії, при попаданні в очі викликає подразнення. Препарат є токсичним для риб і бджіл.

Застосування

Профілактика та лікування собак при ураженнях ектопаразитами:

- блохами (*Ctenocephalides spp.*);
- іксодовими кліщами (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*);
- вошами (*Linognathus setosus*);
- волосоїдами (*Trichodectes canis*).

Профілактика та лікування блошиного алергічного дерматиту собак (FAD).

Дозування

Препарат призначають дорослим собакам та цуценятам старшим 8-ми тижневого віку. Препарат можна застосовувати самкам під час вагітності та лактації.

Мінімальний інтервал між застосуванням препарату становить 4 тижні. Препарат наносять на суху, неушкоджену шкіру тварин між лопатками у дозі – одна піпетка відповідного розміру на одну тварину:

для собак масою тіла 2-10 кг – піпетка 0,67 мл;

для собак масою тіла 10-20 кг – піпетка 1,34 мл;

для собак масою тіла 20-40 кг – піпетка 2,68 мл;

для собак масою тіла 40-60 кг – піпетка 4,02 мл;

для собак масою тіла понад 60 кг – піпетка 4,02 мл і відповідна піпетка з меншою дозою.


Мінімальна рекомендована доза фіпронілу становить 6,7 мг/кг маси тіла тварини.

При підвищеному ризику повторного ураження блохами, при алергії тварин на ураження блохами та іксодовими кліщами, при частому купанні тварин із використанням гіпоалергічного та пом'якшуючого шампуню тварин рекомендують обробляти препаратом щомісяця. У регіонах, де спостерігаються незначні умови ураження блохами та іксодовими кліщами, тварин можна обробляти препаратом ФШРИСТ® Спот-он для собак через кожні два чи три місяці.

Для нанесення препарату необхідно взяти відповідну піпетку з однократною дозою вертикально, відкрутити і зняти ковпачок. Перевернути ковпачок, вставити його зворотню сторону у

1 0. 0 9. 2021

піпетку, натиснути і повернути ковпачок так, щоб проколоти захисну мембрану. Зняти ковпачок з піпетки, розділити шерсть тварини в ділянці основи шиї або в передній частині лопаток, або між лопатками, щоб було видно шкіру. Притиснути кінчик піпетки до шкіри й натиснути на піпетку кілька разів, щоб витиснути вміст піпетки.



Препарат володіє захисним ефектом проти бліх впродовж 2-х місяців та проти іксодових кліщів впродовж 4 тижнів, залежно від епізоотичної ситуації. Після обробки препаратом блохи на шкірі тварини знищуються через 24 годин.

Протипоказання

Не застосовувати препарат тваринам віком до 8 тижнів та масою тіла менше 2 кг !

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам !

Не застосовувати препарат для лікування інших видів тварин, особливо кролів, через ризик виникнення небажаних реакцій, які можуть призвести до загибелі тварин !

Застереження

Лікування рекомендується проводити комплексно із застосуванням етіотропних, патогенетичних і симптоматичних лікарських засобів.

При виявленні іксодових кліщів на тілі тварин їх видаляють механічно (пінцетом) і лише після цього обробляють препаратом.

Препарат наноситься на місця недоступні для злизування твариною. Після обробки препаратом декількох тварин не допускати, щоб тварини облизували одне одного.

Після обробки не рекомендується купати тварин впродовж 2-х діб і не дозволяти їм плавати в водоймах.

Тварин рекомендується купати не частіше одного разу на тиждень. При використанні пом'якшувального шампуню і щотижневому купанні можливе скорочення періоду захисту тварин від бліх до 5-ти тижнів після обробки препаратом ФПРИСТ® Спот-он для собак. Щотижневе купання тварин із використанням лікувального шампуню з 2% хлоргексидином не знижує ефективності препарату після обробки проти бліх (6 тижнів захисту).

За умови, що перед обробкою препаратом тварина була уражена іксодовими кліщами, зараження трансмісивними захворюваннями не виключається. Після обробки препаратом впродовж 24-48 год. іксодові кліщі на тілі тварин гинуть і відпадають.

Після обробки препаратом не виключається ураження тварин поодинокими іксодовими кліщами у період захисної дії препарату.

Предмети догляду та місця перебування тварин (підстилки, килимки, кошики, м'які меблі) необхідно періодично чистити та обробляти відповідними інсекто-акарицидними засобами.

Обробку тварин препаратом ФПРИСТ® Спот-он для собак слід проводити користуючись гумовими рукавичками.

Під час роботи з препаратом не дозволяється курити, пити та приймати їжу.

Після закінчення роботи слід вимити руки теплою водою з милом; вимити та просушити рукавички. При випадковому попаданні препарату на шкіру або слизові оболонки його слід негайно змити проточною водою.

Після обробки тварин препаратом їх не можна гладити та допускати до дітей до повного висихання препарату на шкірі. Також після обробки тварин вони не повинні спати разом з господарями, особливо з дітьми.

1 0. 0 9. 2021

Форма випуску

Поліпропіленові піпетки по 0,67; 1,34; 2,68; 4,02 мл з поліетиленовими або поліоксиметиленовими ковпачками з гострим кінцем. Піпетки запаковані у картонні упакування по 1, по 3 або по 10 штук, кожна піпетка у ламінованому пакеті.

Зберігання

Препарат зберігають в упакуванні виробника в сухому, захищеному від прямих сонячних променів, місці окремо від продуктів харчування та кормів за температури від 0 до 30 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

КРКА, д.д. Ново место
Шмар'єшка цеста 6, 8501 Ново место,
Республіка Словенія


KRKA, d.d., Novo mesto (Slovenia)
Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto

Виробник готового продукту

КРКА, д.д. Ново место
Шмар'єшка цеста 6, 8501 Ново место,
Республіка Словенія

KRKA, d.d., Novo mesto (Slovenia)
Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto

1 0. 0 9. 2021



M 1:1

 - Pantone ReflexBlue C


Article name: TU. FYPRYST dogs 67 mg/0,67 ml UA
Date: 16.09.2020
Prepared by: A. Kirm

DPMockUp096291_1

10.09.2021




 - CMYK

 - *bela barva*


Article name: ATX. FYPRYST cats 67 mg/0,67 ml UA
Date: 17.09.2020
Prepared by: A. Kirm


1 0. 0 9. 2021



CMYK

	KRKA
Article name:	18 FURRYST dogs
Date:	15.12.2020
Prepared by:	D. Kojlat

1 0. 0 9. 2021



 - Pantone ReflexBlue C


Article name: TU. FYPRYST cats 134 mg/1,34 ml UA
Date: 16.09.2020
Prepared by: A. Kirm

1 0. 0 9. 2021




CMYK

- bela barva

Article name: ATX. FYPRYST cats 134 mg/1,34 ml UA
Date: 17.09.2020
Prepared by: A. Kirm

1 0. 0 9. 2021



CMYK

	KRKA
Article name: F8 FURRYST dogs	
30x134 mg/1.34 ml UA	
Date:	15.12.2020
Prepared by:	D. Kozel




1 0. 0 9. 2021



CMYK

Article name: FB.FYPRYST dogs 1x134 mg/1,34 ml UA
Date: 15.12.2020
Prepared by: D. Kožjaž

10.09.2021




Article name: TU. FYPRYST cats 268 mg/2,68 ml UA
Date: 16.09.2020
Prepared by: A. Kirm

1 0. 0 9. 2021

Серія:
Приміт:



СОБАКИ 20-40 кг (kg)

FYPRYST® ФІПРИСТ®

Фіпроніл
Спот-он для собак
Для застосування у ветеринарній медицині!
1 мл (ml) препарату містить діючу речовину: фіпроніл – 100 мг (mg).
Для нашірного застосування.



1
піпетка по 2,68 мл (ml)



xxxxxx



 - CMYK

 - *bela barva*


Article name: ATX. FYPRYST cats 268 mg/2,68ml UA
Date: 17.09.2020
Prepared by: A. Kirm


1 0. 0 9. 2021



- CMYK

Article name: FB.FYPRYST dogs
1x268 mg/2,68 ml UA
Date: 15.12.2020
Prepared by: D. Kočaž

1 0. 0 9. 2021




Article name: TU. FYPRYST cats 402 mg/4,02 ml UA
Date: 16.09.2020
Prepared by: A. Kirm

