

16.10.2024

ФІПРИСТ® спрей для котів та собак
(спрей для зовнішнього застосування, розчин)
листівка-вкладка

Опис

Прозора безбарвна рідина.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

фіпроніл – 2,5 мг.

Допоміжні речовини: коповідон, спирт ізопропіловий, вода дистильована.

Фармакологічні властивості

АТС vet QP53 – ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX15, фіпроніл).

Фіпроніл, який входить до складу препарату, володіє інсектицидною та акарицидною дією до ектопаразитів, які паразитують на собаках та котях: бліх (*Ctenocephalides spp.*, *Pulex irritans*), кліщів (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*), вошей (*Linognathus setosus*) та волосоїдів (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*).

Фіпроніл похідний піразолу, блокує процес проходження іонів хлору в ГАМК-залежних рецепторах ектопаразитів, порушує передачу нервових імпульсів, що призводить до ураження нервової системи ектопаразитів та їх загибелі. Фіпроніл не впливає на центральну нервову систему ссавців.

Застосування

Профілактика та лікування собак та котів при ураженнях ектопаразитами: блохами (*Ctenocephalides spp.*, *Pulex irritans*), волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), вошами (*Linognathus setosus*), паразитиформними кліщами (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*), акариформними кліщами (*Sarcoptes canis*, *Cheyletiella spp.* та *Trombicula autumnalis*).

Профілактика та лікування блошиного алергічного дерматиту собак та котів.

Обробка тварин препаратом забезпечує захист тварин від бліх до 3-х місяців у собак та до 2-х місяців у котів.

Тривалість захисної дії проти ураження кліщами до 1 місяця в собак та котів.

Дозування

Кількість препарату, яка виділяється при одноразовому натисканні дозатора, залежить від об'єму флакона і становить: 0,5 мл для флакона об'ємом 100 мл, 1,5 мл – для флакона об'ємом 250 мл та 3 мл – для флакона об'ємом 500 мл.

Спосіб застосування.

Препарат застосовують собакам та котам зовнішньо шляхом розпилення.

Перед використанням флакон ретельно струсити. Розпилювати препарат на всю поверхню тіла тварини з відстані 10-20 см, проти росту шерсті, слідкуючи, щоб препаратом було змочене все тіло (у т.ч. шерсть): спина, боки, живіт, лапи, холка, хвіст. Для обробки голови та ділянки навколо очей препарат необхідно нанести на руку в рукавиці і обережно втерти в шерсть тварини. У довгошерстих тварин слід скуйовдити шерсть і нанести препарат таким чином, щоб він потрапив на шкіру.

Після обробки препарат повинен висохнути на тілі тварини, не висушувати препарат рушником.

Дозування.

Доза препарату становить 3-6 мл на 1 кг маси тіла залежно від довжини шерсті (від 7,5 до 15 мг фіпронілу на 1 кг маси тіла), що відповідає 6-12 натисканням дозатора для флакона 100 мл, 2-4 натисканням дозатора – для флакона 250 мл або 1-2 натисканням дозатора – для флакона 500 мл.

Флакон об'ємом 100 мл розрахований для восьми обробок kota з короткою шерстю масою тіла 4 кг. Флакон 250 мл розрахований для 4-х обробок короткошерстого собаки масою тіла 20 кг. Флакон 500 мл розрахований для 4-х обробок короткошерстого собаки масою тіла 40 кг.

16. 10. 2024

Мінімальний інтервал між обробками – 4 тижні.

Цуценят та кошенят можна обробляти з 2-добового віку.

Для профілактики ураження тварин ектопаразитами рекомендується регулярно чистити та обробляти відповідними засобами місця перебування тварин.

Якщо тварин купають (миють) миючими засобами частіше 4-х разів впродовж 2-х місяців, тоді рекомендується обробляти їх препаратом щомісяця.

ФІПРИСТ® спрей для котів та собак можна застосовувати самкам собак та котів під час вагітності та лактації.

Протипоказання

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам !

Не застосовувати тваринам із гіперчутливістю до складових препарату !

Не обробляти препаратом тварин інших видів, особливо кролів, у яких препарат може викликати побічну дію, що призводить до загибелі.

Застереження

Не перевищувати рекомендовані дози препарату.

Обробляти тварин препаратом поза приміщенням (на вулиці) або в добре вентиляваному приміщенні.

Не обробляти ушкоджені ділянки шкіри та при обробці не допускати потрапляння препарату в очі.

До повного висихання шерсті після обробки препаратом не можна утримувати тварину в обмеженому закритому просторі (приміщення, сумка для перевезення тварин).

Після обробки тварин препаратом не допускати облизування тваринами одне одного.

Не купати тварин і не дозволяти тваринам плавати у водоймах після обробки препаратом впродовж 2-х діб до та після обробки препаратом.

Тварин після обробки необхідно утримувати подалі від відкритого вогню та нагрівальних приладів до повного висихання шерсті.

При обробці тварин препаратом користуватися резиновими рукавицями та захисним одягом.

Уникати попадання препарату на відкриті ділянки тіла, в очі, всередину, в дихальні шляхи.

При випадковому попаданні препарату в очі їх слід промити великою кількістю чистої води.

При попаданні препарату на відкриті ділянки тіла препарат слід змити тампоном і промити водою з милом.

Після роботи з препаратом необхідно вимити руки з милом.

Особам із відомою гіперчутливістю до фіпронілу або допоміжних речовин препарату слід уникати прямого контакту з препаратом.

Після обробки тварин впродовж 30 хв до повного висихання шерсті не можна гладити тварин та допускати їх до маленьких дітей. Не можна допускати, щоб оброблені препаратом тварини спали із господарями, особливо з дітьми.

Обробку тварин препаратом рекомендується проводити ввечері.

Під час обробки тварин препаратом не можна палити, пити, вживати їжу.

Форма випуску

Флакон з ПВЩ з дозатором по 100, 250, 500 мл у картонній упаковці. Об'єм препарату залежно від об'єму флакона, що виділяється через одне натискання дозатора, становить: 0,5 мл (100 мл), 1,5 мл (250 мл) або 3 мл (500 мл).

Зберігання

Зберігати в недоступному для дітей місці за температури не вище 25 °С. Захищати від прямих сонячних променів.

Термін придатності

3 роки, після першого відкриття - 1 рік.

16.10.2024

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

КРКА, д.д., Ново место
Шмар'єшка цеста 6, 8501 Ново место,
Словенія

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia (Slovenia)
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,

Виробник готового продукту

КРКА, д.д., Ново место
Шмар'єшка цеста 6, 8501 Ново место,
Словенія

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia (Slovenia)
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,